



# Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel



Produkt:

**COMPO  
Ortiva® Spezial Pilz-frei AF**

1/4

Gegen Pilzkrankheiten an Rosen,  
Zierpflanzen und Gemüse

## Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete

Schadorganismus	Kulturart
Rostpilze	Rosen
Rostpilze	Zierpflanzen, Ziergehölze
Kraut- und Braunfäule Samtfleckenkrankheit, Echter Mehltau	Tomaten
Echter Mehltau, Falscher Mehltau	Gurken

## Weitere Anwendungsgebiete nach eigenen Erfahrungen

Schadorganismus	Kulturart
Sternrußtau, Blattflecken, Buchsbaumtriebsterben, Kiefernscütte Falscher Mehltau, Echter Mehltau	Rosen , Zierpflanzen, Ziergehölze
Dürrfleckenkrankheit	Tomaten
Falscher Mehltau	Zucchini

## Produkteigenschaften

- mit einem Dreh anwendungsfertiges Produkt
- kein Anmischen notwendig. Sofort einsetzbar.
- teilsystemisches Fungizid
- auch gegen Sporen wirksam
- gibt kräftigen Wuchs und grüne Blätter
- schont Bienen und andere Nützlinge



# Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel

Produkt:

**COMPO Ortiva® Spezial Pilz-frei AF**

2/4

## Technische Angaben

Produkt-Typ:	Fungizid, flüssig
Wirkstoff:	250 g/l Azoxystrobin
Kennzeichnung:	N, umweltgefährlich
Zulassungsnummer:	024560-72
Österr. Pfl. Reg.-Nr.:	901659
Packungsgröße:	1000 ml Sprühflasche (anwendungsfertig)

## Anwendung

### Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Vor der Anwendung den roten Ring entfernen und den Sprühkopf zusammen mit dem Gewinde fest zudrehen. Anschließend ca. 20 mal gut schütteln. Vor dem weiteren Gebrauch immer wieder aufschütteln. Die Pflanzen von allen Seiten gleichmäßig einsprühen.

Krankheit	Anwendungsgebiet	Maximale Anzahl der Anwendungen	Wartezeiten
Rostpilze, Buchsbäum- triebsterben <sup>1</sup> , Echter Mehltau <sup>1</sup> , Falscher Mehltau <sup>1</sup> , Blattflecken <sup>1</sup> , Sternrußtau <sup>1</sup> , Kiefernscütte <sup>1</sup>	Zierpflanzen, incl. Rosen, Ziergehölze	2 Anwendungen im Abstand von 8-12 Tagen.	Keine
Kraut- und Braunfäule Samtfleckenkrankheit Echter Mehltau Dürrfleckenkrankheit <sup>1</sup>	<b>Tomaten</b>	2 Anwendungen im Abstand von 8-12 Tagen.	3 Tage
Echter Mehltau Falscher Mehltau	<b>Gurken</b>	2 Anwendungen im Abstand von 8-12 Tagen.	3 Tage

<sup>1</sup> Diese Krankheit wird nach eigenen Erfahrungen bei Einsatz in den festgesetzten Anwendungsgebieten mit erfasst.

### Aufwandmenge in Abhängigkeit von der Pflanzenhöhe:

Bei Rosen, Zierpflanzen und Ziergehölzen.

<u>Pflanzenhöhe:</u>	Bis 50 cm	1 l Spritzbrühe für ca. 16 m <sup>2</sup>
	50 bis 125 cm	1 l Spritzbrühe für ca. 11 m <sup>2</sup>
	über 125 cm	1 l Spritzbrühe für ca. 8 m <sup>2</sup>



Produkt:

**COMPO Ortiva® Spezial Pilz-frei AF**

3/4

## Anwendung

### Hinweise zur Vorbeugung von Resistenzen:

Damit die Schaderreger keine Resistenzen (Widerstandskraft) gegenüber dem Wirkstoff aufbauen können, ist das Mittel immer frühzeitig und mit der vollen Aufwandmenge einzusetzen. Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden, wie z.B. COMPO Duaxo® Universal Pilz-frei AF, (Anwendungsgebiete beachten). Dieser Wechsel sollte in nachfolgenden Kulturen (z.B. in Gewächshäusern) fortgesetzt werden. Um Resistenz-bildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

### Anwendungszeitraum:

- Anwendungszeit: April – Oktober
- Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome.
- Jedoch frühestens 3 Wochen nach dem Pflanzen.
- Ein früher Einsatz schützt die Pflanzen am wirkungsvollsten.
- Der Spritzbelag sollte schnell antrocknen können, daher für ausreichende Belüftung durch Schnitt oder Auslichtung sorgen.
- Keine Anwendung unter kühlen, feuchten Bedingungen wie z.B. in den Abendstunden.

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.

### Verträglichkeit:

An Gurken können Schäden in Abhängigkeit von Kultur, Sorte und Anbauverfahren nicht ausgeschlossen werden. Deshalb abends nicht anwenden. An Tomaten nicht bei akuten oder zu erwartenden Temperaturen über 27°C und bei unzureichender Belüftung z. B. unter Folie einsetzen. Erkenntnisse über Unverträglichkeiten liegen bei einzelnen Pflanzenarten und -sorten nicht vor. Trotzdem sollten bei größeren Beständen, unabhängig von der Pflanzenart, Probespritzungen durchgeführt werden. Zierkirschen, Usambaraveilchen, Sämlinge und gestresste Pflanzen nicht behandeln sowie Abdrift vermeiden. Spritzgeräte, mit denen das Mittel ausgebracht wurde, nicht in diesen Kulturen einsetzen. Um Schäden zu verhindern, sind ebenso die Anwendungshinweise zu beachten.

**Diese Produktinformation ersetzt nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.**

**Vor Verwendung stets Etikett- und Produktinformation lesen.**

**Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.**